




Lézard à deux raies

Lacerta bilineata

⚡ Anciennement appelés Lézard vert, nous sommes les plus grands lézards en Mayenne.

📏 45 cm en moyenne



♂ Corps vert, parfois entièrement brun

Vert intense avec de nombreuses petites écailles noires

Lignes latérales plus claires

Gorge bleue en période nuptiale

♀ Juvénile uniformément gris, brun ou vert

Gorge jaunâtre à blanche

Gorge jaunâtre/verdâtre

Subadulte vert avec des lignes blanches et points noirs

🏠 Bord de chemin, lisière forestière, roncier

⚠️ Je pince très fort !

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
------	------	------	------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------




Lézard des murailles

Podarcis muralis

⚡ Rapides, nous nous promenons souvent près de vos maisons. On nous appelle aussi lézards gris !

📏 22 cm en moyenne



Ligne dorsale sombre plus ou moins continue

♀ Dos gris-brun plus clair que les flancs

♂ Large bande sombre bordée de lignes minces claires irrégulières

Marbrures discontinues

Points bleus en quantité variable

♂ Corps et tête élancés, queue longue et fine

Longs doigts et ongles

Autotomie ?

Peut se séparer volontairement d'une portion de son corps qui repoussera

Juvéniles

Motif assez linéaire

🏠 Lieux secs et chauds : muret, éboulis, terrasse

De profil : tête fusiforme

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
------	------	------	------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Fiches pédagogiques - Les reptiles de la Mayenne, réalisées par Juliette Daugeard (VSC) Mayenne Nature Environnement 2024

Fiches pédagogiques - Les reptiles de la Mayenne, réalisées par Juliette Daugeard (VSC) Mayenne Nature Environnement 2024




Lézard vivipare

Zootoca vivipare



Nos femelles ne pondent pas d'œufs, en effet, ils éclosent directement dans leur ventre, elles mettent bas.

20 cm en moyenne




Beaucoup moins rapide que nos cousins Lézards des murailles

Ligne dorso-latérale sombre interrompue de tâches claires

Corps trapu et tête épaisse

Queue épaisse et courte

Pattes et doigts courts




Ligne dorsale sombre

Museau court

Flancs plus foncés que le dos

Corps foncé et brillant



Juvenile

Milieu frais et humide (tourbière, marais)

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
[Activity bar showing activity from May to October]											



Orvet fragile

Anguis fragilis




Comme les autres lézards je suis capable d'autotomie, mais elle peut entraîner ma mort !

50 cm en moyenne

Lézard **serpentiforme** avec des vestiges de pattes, invisibles car sous la peau !

Couleur uniforme brun grisâtre



Peau lisse et luisante


Tâches bleues



Bicolore
Dos jaune, cuivré à grisâtre
Flancs plus sombres

Ligne dorsale

Dos argenté ou doré



Juvenile

Prairie, bocage, forêt

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
[Activity bar showing activity from April to October]											

Fiches pédagogiques - Les reptiles de la Mayenne, réalisées par Juliette Daugeard (VSC) Mayenne Nature Environnement 2024

Fiches pédagogiques - Les reptiles de la Mayenne, réalisées par Juliette Daugeard (VSC) Mayenne Nature Environnement 2024

© F. Serre Collet

© D. Jablonski



Couleuvre d'Esculape


Zamenis longissimus

On m'a choisi comme symbole de l'OMS. Je suis l'attribut du Dieu de la médecine duquel je tire mon nom vernaculaire.



Jusqu'à 2 m

Adulte



©P. Gourdain

Corps brillant olivâtre, beige ou brun assez uniforme

Grandes écailles

Écailles dorsales bordées de blanc

Museau arrondi

Pupilles rondes

Ventre et dessous de la tête jaune

Raie unique sous l'œil « larme »


Tâche noire derrière l'œil

Dos brun et beige à motifs

⚠ Confusion possible avec la Couleuvre helvétique !

Prairie, bocage, forêt, toitures de granges

Juvénile



Couleuvre helvétique

Natrix helvetica


Avec nos cousines les couleuvres vipérines, nous sommes d'excellentes nageuses.



Jusqu'à 1,5 voire 2 m

Longue queue effilée

Dos olivâtre, brun ou grisâtre avec une rangée de taches noires



©J-C de Massary


Pupilles rondes

Collier caractéristique Jaune crème bordé de noir

Ventre clair marqué de taches noires

Écailles labiales claires bordées de noir

Grandes écailles



Milieus humides : étang, rivière, fossé bocager

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.



Coronelle lisse

Coronella autriaca



Nous sommes très discrètes, si vous souhaitez nous observer soyez patients et ouvrez l'œil !

Jusqu'à 90 cm

Ecailles d'aspect lisse et brillant

Robe variable grise, beige ou brune



© F. Serre Collet

Taches foncées sur le dos

Raie sombre de la narine et traversant l'œil

Pupilles rondes

Milieus chauds et secs : éboulis, voie ferrée

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
------	------	------	------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

© F. Serre Collet



Vipère péliade

Vipera berus



On nous retrouve de la Bretagne au nord de la Chine ! Nos populations sont cependant très fragmentées et partout en déclin.

Museau carré

Jusqu'à 65 cm

Iris rougeâtre
Pupille verticale

Couleurs très variables brun, rougeâtre, gris, beige

Tête triangulaire
Dessin en « V »

Nombreuses petites plaques

Motif dorsale sombre en zig-zag

Corps trapu et queue courte

Fiches pédagogiques – Les reptiles de la Mayenne, réalisées par Juliette Daugeard (VSC) Mayenne Nature Environnement 2024

Fiches pédagogiques – Les reptiles de la Mayenne, réalisées par Juliette Daugeard (VSC) Mayenne Nature Environnement 2024

Végétation clairsemée
Milieu frais, humide

Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
------	------	------	------	-----	-----	-------	------	-------	------	------	------

Venimeuse

©T. Cuenot



Vipère aspic

Vipera aspis

Victimes de notre réputation, on nous tue. Pourtant nous sommes utiles dans notre milieu. Notre venin nous sert à chasser ou à nous défendre.

Jusqu'à 65 cm

Museau retroussé

Motif sombre en zig-zag

Iris doré à cuivré



Milieus secs : coteau calcaire, bocage, lisière de haie

Grande variabilité de couleurs
Dos brun, rougeâtre ou gris clair

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.



Couleuvre vipérine

Natrix maura

Usurpatrices, nous imitons les vipères afin de repousser nos prédateurs. Nous restons cependant aussi inoffensives que les autres couleuvres

Jusqu'à 70 cm

Motif sombre en zig-zag

Œil et pupille très ronds

Grandes plaques

Ocelles claires sur les flancs

Tête triangulaire quand menacée

Milieus humides : étang, rivière, fossé bocager

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.